喘息のくすり一覧

編集協力／日本アレルギー協会理事長　東京大学名誉教授　宮本昭正

この一覧表の使用法（医師と患者の相互理解を深めるために）

(1)初診時、従来使われていた薬剤の確認に。

(2)投薬時、本一覧を見せながら説明することにより誤認・誤用を防げる。

(3)再診時、服用された薬剤の効果を正しく確認できる。

(4)通常用量*が示されている。

＊用量は各薬剤の通常用量のみを示しています。使用時には、添付文書を確認してください。

喘息治療の目標

- 健常人と変わらない日常生活を送ることができる。
- 非可逆的な気道リモデリングへの進展を防ぎ、正常に近い呼吸機能を保つ。
  PEFが予測値の80%以上かつ、PEFの変動が予測値の20%未満。
- 夜間・早朝を含めた喘息発作の予防。
- 喘息死の回避。
- 治療薬による副作用発現の回避。

（喘息予防・管理ガイドライン2015）より

グラクソ・スミスクライン株式会社

吸入用ステロイド薬・β_2刺激薬配合剤

レルベア
100エリプタ 14吸入用

レルベア
100エリプタ 30吸入用

レルベア
200エリプタ 14吸入用

レルベア
200エリプタ 30吸入用

100・200エリプタ1吸入/回、1回/日（成人）

アドエア　100・250・500ディスカス 1吸入/回、2回/日（成人）、50・125・250エアゾール 2吸入/回、2回/日（成人）
100ディスカス 1吸入/回、2回/日、50エアゾール 1～2吸入/回、2回/日（小児）

60吸入用

100 ディスカス

250 ディスカス

500 ディスカス

50エアゾール
120吸入用

125エアゾール
120吸入用

250エアゾール
120吸入用

28吸入用

100 ディスカス

250 ディスカス

500 ディスカス

フルティフォーム
50エアゾール
56吸入用

フルティフォーム
50エアゾール
120吸入用

フルティフォーム
125エアゾール
56吸入用

フルティフォーム
125エアゾール
120吸入用

50エアゾール2吸入/回、2回/日（成人）
症状に応じて、125エアゾール2～4吸入/回、2回/日（成人）

シムビコート
タービュヘイラー
30吸入

シムビコート
タービュヘイラー
60吸入

1～4吸入/回
2回/日（成人）

1～4吸入/回
2回/日（成人）

維持療法として1回1吸入あるいは2吸入を1日2回投与している患者は、発作発現時に本剤の頓用吸入を追加で行うことができる。

生物学的製剤

① 抗IL-5抗体薬

ヌーカラ皮下注用 100mg

100mg/回、4週間ごとに皮下注
（成人、12歳以上の小児）

② 抗IgE抗体薬

ゾレア皮下注用 150mg

ゾレア皮下注用 75mg

75～600mg/回、2週間または
4週間ごとに皮下注（成人・小児）

吸入用ステロイド薬

フルタイド　100～400μg/回、2回/日（成人）　50～100μg/回、2回/日（小児）

50 ディスカス

100 ディスカス

200 ディスカス

50μgエアゾール
120吸入用

100μgエアゾール
60吸入用

50ロタディスク

100ロタディスク

200ロタディスク

ディスクヘラー

キュバール50
エアゾール

2吸入/回、2回/日（成人）
1吸入/回、2回/日（小児）

キュバール100
エアゾール

1吸入/回
2回/日（成人）

アズマネックス
ツイストヘラー
100μg 60吸入

アズマネックス
ツイストヘラー
200μg 60吸入

100～400μg/回、2回/日（成人）

オルベスコ50μg
インヘラー112吸入用

オルベスコ100μg
インヘラー56吸入用

オルベスコ100μg
インヘラー112吸入用

オルベスコ200μg
インヘラー56吸入用

100～400μg/回、
1回/日（成人）
100～200μg/回、
1回/日（小児）

パルミコート100μg
タービュヘイラー
112吸入

パルミコート200μg
タービュヘイラー
56吸入

パルミコート200μg
タービュヘイラー
112吸入

パルミコート吸入液
0.25mg　0.5mg

0.5mg/回、2回/日
または1mg/回、1回/日（成人）
0.25mg/回、2回/日
または0.5mg/回、1回/日
（6ヵ月以上の小児）

100～400μg/回、2回/日（成人）　100～200μg/回、2回/日（小児）

■副腎皮質ステロイド薬

コートリル錠10mg

1～12錠/日、1～4回/日（成人）

プレドニゾロン錠1mg

5～60錠/日、1～4回/日（成人）

プレドニゾロン錠5mg

1～12錠/日、1～4回/日（成人）

レダコート錠4mg

1～12錠/日、1～4回/日（成人）

プレドニゾロン錠「タケダ」5mg



1～12錠/日、1～4回/日（成人）

プレドニゾロン散「タケダ」1%

0.5～6g/日、
1～4回/日（成人）

デカドロン錠0.5mg

1～16錠/日、
1～4回/日（成人）

デカドロン錠4mg

0.5～8mg/日、
1～4回/日（成人）

メドロール錠2mg

2～24錠/日、
1～4回/日（成人）

メドロール錠4mg

1～12錠/日、
1～4回/日（成人）

リンデロン錠0.5mg

1～16錠/日、1～4回/日（成人）

リンデロン散0.1%

0.5～8mg/日、
1～4回/日（成人）

リンデロンシロップ0.01%

0.5～8mg/日、
1～4回/日（成人）
0.15～4mg/日、
1～4回/日（小児）

■気管支拡張薬

①キサンチン誘導体

テオドール錠50mg

4錠/回、2回/日（成人）
または8錠/回、1回/日（成人）
2～4錠/回、2回/日（小児）

テオドール錠100mg



2錠/回、2回/日（成人）
または4錠/回、1回/日（成人）
1～2錠/回、2回/日（小児）

テオドール錠200mg

1錠/回、2回/日（成人）
または2錠/回、1回/日（成人）

テオドール顆粒20%



1g/回、2回/日（成人）
0.5～1g/回、2回/日（小児）

テオドール シロップ2%

0.2～0.4mL/kg/日、
2回/日（小児）

テオドール ドライシロップ20%



20～40mL/kg/日、
2回/日（小児）

■気管支拡張薬

①キサンチン誘導体

テオロング錠50mg

4錠/回、2回/日（成人）
2～4錠/回、2回/日（小児）

テオロング錠100mg

2錠/回、2回/日（成人）
1～2錠/回、2回/日（小児）

テオロング錠200mg

1錠/回、2回/日（成人）

テオロング顆粒50%

0.4g/回、2回/日（成人）
0.2～0.4g/回、2回/日（小児）

スロービッドカプセル50mg

4カプセル/回、2回/日（成人）
2～4カプセル/回、2回/日（小児）

スロービッドカプセル100mg



2カプセル/回、2回/日（成人）
1～2カプセル/回、2回/日（小児）

スロービッドカプセル200mg

1カプセル/回、2回/日（成人）

ユニフィルLA錠100mg



4錠/回、1回/日（成人）

ユニフィルLA錠200mg



2錠/回、1回/日（成人）

ユニフィルLA錠400mg

1錠/回、1回/日（成人）

ユニコン錠100

4錠/回、1回/日（成人）

ユニコン錠200

2錠/回、1回/日（成人）

ユニコン錠400

1錠/回、1回/日（成人）

ネオフィリン錠100mg

3～4錠/日、3～4回/日（成人）
2～4mg/kg/回、3～4回/日（小児）

モノフィリン錠100mg



2～3錠/日、2～3回/日（成人）

アストフィリン配合錠

1～2錠/回、2～3回/日（成人）

②交感神経刺激薬

セレベント　50μg/回、2回/日（成人）　25μg/回、2回/日（小児）

50 ディスカス

25 ロタディスク　50 ロタディスク



ディスクヘラー

② 交感神経刺激薬

ベネトリン吸入液 0.5%

0.3～0.5mL/回（成人）
0.1～0.3mL/回（小児）

ベネトリンシロップ 0.04%

0.75mL/kg/日
3回/日（乳幼児）

サルタノールインヘラー 100μg

2吸入/回（成人）
1吸入/回（小児）

アイロミールエアゾール 100μg

2吸入/回（成人）
1吸入/回（小児）

ベロテックエロゾル100

2吸入/回（成人）

ベロテックシロップ

0.75mL/kg/日
3回/日（幼小児）

アスプール液（0.5%）

0.6mL/回（成人）

メプチンエアー 10μg 吸入100回

2吸入/回（成人）
1吸入/回（小児）

メプチンキッドエアー 5μg 吸入100回

4吸入/回（成人）
2吸入/回（小児）

メプチン スイングヘラー 10μg 吸入100回

2吸入/回（成人）
1吸入/回（小児）

メプチン吸入液 0.01%

メプチン吸入液ユニット 0.3mL 0.5mL

0.3～0.5mL/回（成人）
0.1～0.3mL/回（小児）

メプチンミニ錠25μg

2錠/回、1～2回/日（成人）
1錠/回、1～2回/日（6歳以上の小児）

メプチン錠50μg

1錠/回、1～2回/日（成人）

メプチン顆粒 0.01%

0.5g/回、
1～2回/日（成人）
0.25g/回、
1～2回/日（6歳以上）
0.0125g/回、
2～3回/日（6歳未満）

メプチンシロップ 5μg/mL

10mL/回、
1～2回/日（成人）
5mL/回、
1～2回/日（6歳以上）
0.25mL/回、
2～3回/日（6歳未満）

メプチンドライシロップ 0.005%

1g/回、
1～2回/日（成人）
0.5g/回、
1～2回/日（6歳以上）
0.025g/kg/回、
2～3回/日（6歳未満）

② 交感神経刺激薬

ホクナリンテープ

0.5mg/回、1回/日
（0.5～3歳未満）

1mg/回、1回/日
（3～9歳未満）

2mg/回、1回/日
（成人·9歳以上）

（胸部、背部、上腕部のいずれかに貼付）

ホクナリン錠1mg

1錠/回、2回/日（成人）

ホクナリンドライシロップ 0.1%小児用

40mg/kg/日、2回/日（小児）

ベネトリン錠2mg

2錠/回、3回/日（成人）
0.3mg/kg/回、3回/日（小児）

ブリカニール錠2mg



2錠/回、3回/日（成人）
1錠/回、3回/日（6歳以上）
1/2錠/回、3回/日（5歳以下）

ブリカニール シロップ 0.5mg/mL



0.45mL/kg/日、
3回/日（幼小児）

ベラチン錠1mg

1錠/回、2回/日（成人）

ベラチンドライシロップ 小児用0.1%



40mg/kg/日、2回/日（小児）

ベロテック錠2.5mg

1錠/回、3回/日

スピロペント錠10μg

2錠/回、2回/日（成人）
0.3μg/kg/回、2回/日
（5歳以上の小児）

スピロペント顆粒0.002%

20μg/回、2回/日（成人）
0.3μg/kg/回、2回/日（5歳以上の小児）

③ 副交感神経遮断薬

スピリーバ2.5μg レスピマット 60吸入

2吸入/回、1回/日（成人）

アトロベント エロゾル20μg

1～2吸入/回、3～4回/日（成人）

テルシガン エロゾル100μg

1～2吸入/回、3回/日（成人）

① ロイコトリエン拮抗薬

オノンカプセル 112.5mg

450mg/日、2回/日（成人）

オノンドライシロップ 10%

7mg/kg/日、2回/日（小児）

シングレアチュアブル錠5mg

1錠/回、1回/日（6歳以上の小児）

シングレア錠5mg

2錠/回、1回/日（成人）

シングレア錠 10mg



1錠/回、1回/日（成人）

シングレアOD錠 10mg

1錠/回、1回/日（成人）

シングレア細粒 4mg

4mg/回、1回/日（1歳以上6歳未満の小児）

キプレスチュアブル錠5mg

1錠/回、1回/日（6歳以上の小児）

キプレス錠5mg

2錠/回、1回/日（成人）

キプレス錠 10mg

1錠/回、1回/日（成人）

キプレスOD錠 10mg

1錠/回、1回/日（成人）

キプレス細粒 4mg

4mg/回、1回/日（1歳以上6歳未満の小児）

② メディエーター遊離抑制薬

インタール エアロゾル 1mg

2噴霧/回、4回/日
（成人・小児）

インタール カプセル外用20mg

1カプセル/回、
3～4カプセル/日

インタール吸入液 1%

1アンプル/回、
3～4アンプル/日

② メディエーター遊離抑制薬

リザベンカプセル 100mg

1カプセル/回、3回/日（成人）

リザベン細粒 10%

1g/回、3回/日（成人）
0.05g/kg/回、3回/日（小児）

リザベンドライシロップ 5%

0.1g/kg/回、3回/日（小児）

ペミラストン錠 5mg

1錠/回、2回/日（5～11歳未満）

ペミラストン錠 10mg

1錠/回、2回/日（成人・11歳以上）

ペミラストンドライシロップ 0.5%

0.2mg/kg/回、2回/日（小児）

アレギサール錠 5mg

1錠/回、2回/日（5～11歳未満）

アレギサール錠 10mg

1錠/回、2回/日（成人・11歳以上）

アレギサールドライシロップ 0.5%



0.2mg/kg/回、2回/日（小児）

ソルファ 25mg錠

25～50mg/日、3回/日（成人）

ソルファ 50mg錠

25～50mg/日、3回/日（成人）

ケタスカプセル 10mg

1カプセル/回、2回/日（成人）

③ ヒスタミンH1拮抗薬

アゼプチン錠 1mg

2錠/回、2回/日（成人）

アゼプチン錠0.5mg

4錠/回、2回/日（成人）

アゼプチン顆粒0.2%

2mg/回、2回/日（成人）

■抗アレルギー薬

③ ヒスタミンH1拮抗薬

ザジテンカプセル 1mg

1カプセル/回、2回/日（成人）

ゼスラン錠 3mg

2錠/回、2回/日（成人）

ニポラジン錠 3mg

2錠/回、2回/日（成人）

アレジオン錠 10

2錠/回、1回/日（成人）

アレジオン錠 20

1錠/回、1回/日（成人）

④トロンボキサンA2合成阻害薬

ベガ錠 100mg

400mg/日、2回/日（成人）

ベガ錠 200mg

400mg/日、2回/日（成人）

ドメナン錠 100mg

400mg/日、2回/日（成人）

ドメナン錠 200mg

400mg/日、2回/日（成人）

⑤トロンボキサンA2拮抗薬

ブロニカ錠 40

2錠/回、1回/日（成人）

ブロニカ錠 80

1錠/回、1回/日（成人）

ブロニカ顆粒 10%

80mg/回、
1回/日（成人）

⑥ TH2サイトカイン阻害薬

アイピーディカプセル 50

2カプセル/回、3回/日（成人）

アイピーディカプセル 100



1カプセル/回、3回/日（成人）

アイピーディドライシロップ 5%



3mg/kg/回、2回/日（小児）

■漢方製剤

ツムラ-19（ツムラ小青竜湯エキス顆粒）

9g/日、2〜3回/日（成人）

ツムラ-29（ツムラ麦門冬湯エキス顆粒）

9g/日、2〜3回/日（成人）

ツムラ-96（ツムラ柴朴湯エキス顆粒）

7.5g/日、2〜3回/日（成人）

N19（コタロー小青竜湯エキス細粒）

7.5g/日、2〜3回/日（成人）

N29（コタロー麦門冬湯エキス細粒）

15g/日、2〜3回/日（成人）

N55（コタロー麻杏甘石湯エキス細粒）

6g/日、2〜3回/日（成人）

EK-19（クラシエ小青竜湯エキス細粒）



6g/日、3回/日（成人）

EKT-19（クラシエ小青竜湯エキス錠）



18錠/日、2〜3回/日（成人）

EK-96（クラシエ柴朴湯エキス細粒）

7.5g/日、3回/日（成人）

KB-19（クラシエ小青竜湯エキス細粒）



6g/日、2回/日（成人）

KB-96（クラシエ柴朴湯エキス細粒）



7.5g/日、2回/日（成人）

■去痰薬

ムコソルバン錠 15mg

1錠/回、3回/日（成人）

ムコソルバンLカプセル 45mg

1カプセル/回、1回/日（成人）

ムコダイン錠 250mg

2錠/回、3回/日（成人）

ムコダイン錠 500mg

1錠/回、3回/日（成人）

ムコダイン DS50%

1g/回、3回/日（成人）
0.02g/kg/回、
3回/日（小児）

ムコダイン シロップ 5%

0.6mL/kg/日
3回/日（幼・小児）

クリアナール錠 200mg

2錠/回、3回/日（成人）

スペリア錠 200

2錠/回、3回/日（成人）

＊用法・用量は『日本医薬品集 医療薬 2015年版』(㈱じほう、2014)の記載の通常用量によります。使用時には、各社添付文書を確認してください。

喘息のくすり一覧

編集協力／日本アレルギー協会理事長　東京大学名誉教授　宮本昭正
発行／ライフサイエンス出版
〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町8-1　TEL (03) 3664-7900
提供／グラクソ・スミスクライン株式会社

© Life Science Publishing, 2016

[資料請求・問い合わせ先]
グラクソ・スミスクライン株式会社
〒151-8566　東京都渋谷区千駄ヶ谷 4－6－15 GSK ビル
グラクソ・スミスクラインの製品に関するお問い合わせ・資料請求先
TEL：0120-561-007 (9:00～18:00／土日祝日および当社休業日を除く)
FAX：0120-561-047 (24時間受付)

01CM64-D1611N
改訂年月：2016年11月