

レルベア  
100エリプタ 14吸入用



レルベア  
100エリプタ30吸入用



レルベア  
200エリプタ14吸入用



レルベア  
200エリプタ30吸入用



100・200エリプタ1吸入/回、1回/日(成人)

アドエア

60吸入用 100 ディスカス



250 ディスカス



500 ディスカス



50エアゾール  
120吸入用



125エアゾール  
120吸入用



250エアゾール  
120吸入用



28吸入用 100 ディスカス



250 ディスカス



500 ディスカス



50・125・250エアゾール2吸入/回、2回/日(成人)、  
50エアゾール 1~2吸入/回、2回/日(小児)

100・250・500ディスクス 1吸入/回、2回/日(成人)、100ディスクス 1吸入/回、2回/日(小児)

フルティフォーム  
50エアゾール  
56吸入用



フルティフォーム  
50エアゾール  
120吸入用



フルティフォーム  
125エアゾール  
56吸入用



フルティフォーム  
125エアゾール  
120吸入用



50エアゾール2吸入/回、2回/日(小児、成人)  
症状に応じて、125エアゾール2~4吸入/回、2回/日(成人)

シムビコート  
タービュヘイラー  
30吸入



1~4吸入/回  
2回/日(成人)

シムビコート  
タービュヘイラー  
60吸入



1~4吸入/回  
2回/日(成人)

維持療法として1回1吸入あるいは2吸入を1日2回投与している患者は、発作発現時に本剤の頓用吸入を追加で行うことができる。

アテキュラ  
吸入用カプセル低用量



アテキュラ  
吸入用カプセル中用量



アテキュラ  
吸入用カプセル高用量



1カプセル/回、1回/日(成人)

ブリーズヘラー



■吸入用ステロイド薬・ $\beta_2$ 刺激薬・  
抗コリン薬配合剤

テリルジー  
100エリプタ14吸入用



テリルジー  
100エリプタ30吸入用



テリルジー  
200エリプタ14吸入用



テリルジー  
200エリプタ30吸入用



エリプタ1吸入/回、1回/日(成人)

エナジア  
吸入用カプセル中用量



エナジア  
吸入用カプセル高用量



ブリーズヘラー



1カプセル/回、1回/日(成人)

■生物学的製剤

① 抗IL-5抗体製剤・抗IL-5受容体 $\alpha$ 鎖抗体製剤

ヌーカラ皮下注100mgペン



ヌーカラ皮下注用100mg  
バイアル



ヌーカラ皮下注100mgシリンジ



ファセンラ皮下注30mgシリンジ



30mg/回、初回、4週後、8週後に皮下注。以降8週間隔で皮下注(成人)

ペン・シリンジ: 100mg/回、4週間ごとに皮下注(成人、12歳以上の小児)

バイアル: 100mg/回、4週間ごとに皮下注(成人、12歳以上の小児)

40mg/回、4週間ごとに皮下注(6歳以上12歳未満の小児)

② 抗IgE抗体製剤

ゾレア皮下注用150mg



ゾレア皮下注用75mg



ゾレア皮下注150mgシリンジ



ゾレア皮下注75mgシリンジ



75~600mg/回、2週間または4週間ごとに皮下注(成人・小児)

③ ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体デュビルマブ(遺伝子組み換え)製剤

デュピクセント  
皮下注300mgシリンジ



初回600mg、その後300mg/回を2週間間隔で皮下注(成人、12歳以上の小児)

デュピクセント  
皮下注300mgペン





アヌイティ 100 $\mu$ g  
エリプタ30吸入用



100 $\mu$ g・200 $\mu$ gエリプタ1吸入/回、1回/日 (成人)

アヌイティ 200 $\mu$ g  
エリプタ30吸入用



フルタイド  
50 ディスカス



100~400 $\mu$ g/回、2回/日 (成人) 50~100 $\mu$ g/回、2回/日 (小児)

100 ディスカス



200 ディスカス



フルタイド

50 $\mu$ gエアゾール  
120吸入用



100 $\mu$ gエアゾール  
60吸入用



50ロタディスク  
フルタイド  
Flutide  
50 $\mu$ g 吸入専用



100ロタディスク  
フルタイド  
Flutide  
100 $\mu$ g 吸入専用



200ロタディスク  
フルタイド  
Flutide  
200 $\mu$ g 吸入専用



100~400 $\mu$ g/回、2回/日 (成人)  
50~100 $\mu$ g/回、2回/日 (小児)

ディスクヘラー



キュバール50  
エアゾール



2吸入/回、2回/日 (成人)  
1吸入/回、2回/日 (小児)

キュバール100  
エアゾール



1吸入/回  
2回/日 (成人)

アズマネックス  
ツイストヘラー  
100 $\mu$ g 60吸入



100~400 $\mu$ g/回、2回/日 (成人)

アズマネックス  
ツイストヘラー  
200 $\mu$ g 60吸入



オルベスコ 50 $\mu$ g  
インヘラー 112吸入用



オルベスコ 100 $\mu$ g  
インヘラー 56吸入用



オルベスコ 100 $\mu$ g  
インヘラー 112吸入用



オルベスコ 200 $\mu$ g  
インヘラー 56吸入用



100~400 $\mu$ g/回、  
1回/日 (成人)  
100~200 $\mu$ g/回、  
1回/日 (小児)

パルミコート 100 $\mu$ g  
タービュヘイラー  
112吸入



100~400 $\mu$ g/回、2回/日 (成人)

パルミコート 200 $\mu$ g  
タービュヘイラー  
56吸入



パルミコート 200 $\mu$ g  
タービュヘイラー  
112吸入



パルミコート吸入液  
0.25mg 0.5mg



0.5mg/回、2回/日  
または1mg/回、1回/日 (成人)  
0.25mg/回、2回/日  
または0.5mg/回、1回/日  
(6か月以上の小児)

コートリル錠 10mg



1~12錠/日、1~4回/日 (成人)

プレドニゾン錠 1mg



5~60錠/日、1~4回/日 (成人)

プレドニゾン錠 5mg



1~12錠/日、1~4回/日 (成人)

レダコート錠 4mg



1~12錠/日、1~4回/日 (成人)

プレドニゾン錠「タケダ」5mg



1~12錠/日、1~4回/日 (成人)



プレドニゾン散「タケダ」1%

0.5~6g/日、  
1~4回/日 (成人)

デカドロン錠 0.5mg



1~16錠/日、  
1~4回/日 (成人)

デカドロン錠 4mg



0.5~8mg/日、  
1~4回/日 (成人)

メドロール錠 2mg



2~24錠/日、  
1~4回/日 (成人)

メドロール錠 4mg



1~12錠/日、  
1~4回/日 (成人)

リンデロン錠 0.5mg



1~16錠/日、1~4回/日 (成人)



リンデロン散 0.1%

0.5~8mg/日、  
1~4回/日 (成人)



リンデロンシロップ 0.01%

0.5~8mg/日、  
1~4回/日 (成人)  
0.15~4mg/日、  
1~4回/日 (小児)

① キサンチン誘導体

テオドール錠 50mg



4錠/回、2回/日 (成人)  
または8錠/回、1回/日 (成人)  
2~4錠/回、2回/日 (小児)

テオドール錠 100mg



2錠/回、2回/日 (成人)  
または4錠/回、1回/日 (成人)  
1~2錠/回、2回/日 (小児)

テオドール錠 200mg



1錠/回、2回/日 (成人)  
または2錠/回、1回/日 (成人)

テオドール顆粒 20%



1g/回、2回/日 (成人)  
0.5~1g/回、2回/日 (小児)

テオロング錠 100mg



2錠/回、2回/日 (成人)  
1~2錠/回、2回/日 (小児)

テオロング錠 200mg



1錠/回、2回/日 (成人)


テオロング錠 50mg



4錠/回、2回/日 (成人)  
2~4錠/回、2回/日 (小児)



スロービッドカプセル50mg



4カプセル/回、2回/日 (成人)  
2~4カプセル/回、2回/日 (小児)

ユニフィルLA錠  
100mg



4錠/回、1回/日 (成人)

ユニコン錠 100




4錠/回、1回/日 (成人)

ネオフィリン錠 100mg



3~4錠/日、3~4回/日 (成人)  
2~4mg/kg/回、3~4回/日 (小児)

スロービッドカプセル 100mg



2カプセル/回、2回/日 (成人)  
1~2カプセル/回、2回/日 (小児)

ユニフィルLA錠  
200mg




2錠/回、1回/日 (成人)

ユニコン錠 200



2錠/回、1回/日 (成人)

モノフィリン錠 100mg



2~3錠/日、2~3回/日 (成人)

スロービッドカプセル200mg



1カプセル/回、2回/日 (成人)

ユニフィルLA錠  
400mg



1錠/回、1回/日 (成人)

ユニコン錠 400



1錠/回、1回/日 (成人)

アストフィリン配合錠



1~2錠/回、2~3回/日 (成人)

② 交感神経刺激薬

セレベント 50μg/回、2回/日 (成人) 25μg/回、2回/日 (小児)

50 ディスカス



25 ロタディスク 50 ロタディスク



ディスクヘラー



ベロテックエロゾル 100



2吸入/回 (成人)

ベロテックシロップ 0.05%



0.75mL/kg/日、3回/日 (幼小児)

アスプールの液 (0.5%)



0.6mL/回 (成人)

メブチンエア  
10 $\mu$ g  
吸入100回



2吸入/回(成人)  
1吸入/回(小児)

メブチンキッドエア  
5 $\mu$ g  
吸入100回



4吸入/回(成人)  
2吸入/回(小児)

メブチン  
スイングヘラー  
10 $\mu$ g 吸入100回



2吸入/回(成人)  
1吸入/回(小児)

メブチン  
吸入液  
0.01%



0.3~0.5mL/回(成人)  
0.1~0.3mL/回(小児)

メブチン  
吸入液ユニット  
0.3mL 0.5mL



メブチンミニ錠25 $\mu$ g



2錠/回、1~2回/日(成人)  
1錠/回、1~2回/日(6歳以上の小児)

メブチン顆粒  
0.01%



0.5g/回、  
1~2回/日(成人)  
0.25g/回、  
1~2回/日(6歳以上)  
0.0125g/kg/回、  
2~3回/日(6歳未満)

メブチンシロップ  
5 $\mu$ g/mL



10mL/回、  
1~2回/日(成人)  
5mL/回、  
1~2回/日(6歳以上)  
0.25mL/kg/回、  
2~3回/日(6歳未満)

メブチンドライシロップ  
0.005%



1g/回、  
1~2回/日(成人)  
0.5g/回、  
1~2回/日(6歳以上)  
0.025g/kg/回、  
2~3回/日(6歳未満)

メブチン錠50 $\mu$ g



1錠/回、1~2回/日(成人)

ベネトリン錠2mg



2錠/回、3回/日(成人)  
0.3mg/kg/回、3回/日(小児)

ベネトリン吸入液0.5%



0.3~0.5mL/回(成人)  
0.1~0.3mL/回(小児)

ベネトリンシロップ0.04%




0.75mL/kg/日  
3回/日(乳幼児)

サルタノールインヘラー  
100 $\mu$ g



2吸入/回(成人)、1吸入/回(小児)

ブリカニール錠2mg



2錠/回、3回/日(成人)  
1錠/回、3回/日(6歳以上)  
1/2錠/回、3回/日(5歳以下)

ブリカニール  
シロップ  
0.5mg/mL



0.45mL/kg/日、  
3回/日(幼小児)

ホクナリンテープ



0.5mg/回、1回/日  
(0.5~3歳未満)



1mg/回、1回/日  
(3~9歳未満)



2mg/回、1回/日  
(成人・9歳以上)

ホクナリン錠1mg



1錠/回、2回/日(成人)

ホクナリンドライシロップ  
0.1%小児用



40mg/kg/日、2回/日(小児)

(胸部、背部、上腕部のいずれかに貼付)

ベラチン錠 1mg



1錠/回、2回/日 (成人)

ベラチンドライシロップ  
小児用0.1%



40mg/kg/日、2回/日 (小児)

スピロペント錠 10μg



2錠/回、2回/日 (成人)  
0.3μg/kg/回、2回/日 (5歳以上の小児)

③ 副交感神経遮断薬

スピリーバ 1.25μg  
レスピマット 60吸入



2吸入/回、1回/日 (成人)

スピリーバ 2.5μg  
レスピマット 60吸入



2吸入/回、1回/日 (成人)

アトロベント  
エロゾル 20μg



1~2吸入/回、3~4回/日 (成人)


① ロイコトリエン受容体拮抗薬

オノンカプセル 112.5mg



450mg/日、2回/日 (成人)

オノンドライシロップ 10%



7mg/kg/日、2回/日 (小児)

シングレアチュアブル錠 5mg



1錠/回、1回/日 (6歳以上の小児)

シングレア錠 5mg



2錠/回、1回/日 (成人)

シングレア錠 10mg



1錠/回、1回/日 (成人)

シングレアOD錠 10mg



1錠/回、1回/日 (成人)

シングレア細粒 4mg



4mg/回、1回/日  
(1歳以上6歳未満の小児)



キプレスチュアブル錠 5mg



1錠/回、1回/日 (6歳以上の小児)

キプレス錠 5mg



2錠/回、1回/日 (成人)

キプレス錠 10mg



1錠/回、1回/日 (成人)

キプレスOD錠 10mg



1錠/回、1回/日 (成人)

キプレス細粒 4mg



4mg/回、1回/日  
(1歳以上6歳未満の小児)

② メディエーター遊離抑制薬

インタール  
エアロゾル 1mg

2噴霧/回、4回/日  
(成人・小児)



インタール吸入液 1%

1アンプル/回、  
3~4アンプル/日




ケタスカプセル 10mg



1カプセル/回、2回/日 (成人)

リザベンカプセル 100mg



1カプセル/回、3回/日 (成人)

リザベン細粒 10%



1g/回、3回/日 (成人)  
0.05g/kg/回、3回/日 (小児)

リザベンドライシロップ 5%



0.1g/kg/回、3回/日 (小児)

ペミラストーン錠 5mg



1錠/回、2回/日 (5~11歳未満)

ペミラストーン錠 10mg



1錠/回、2回/日 (成人・11歳以上)

ペミラストーンドライシロップ 0.5%



0.2mg/kg/回、2回/日 (小児)

アレキサールドライシロップ 0.5%



0.2mg/kg/回、2回/日 (小児)

アレキサール錠 5mg



1錠/回、2回/日 (5~11歳未満)

アレキサール錠 10mg



1錠/回、2回/日 (成人・11歳以上)



③ ヒスタミンH<sub>1</sub>拮抗薬

アゼブチン錠0.5mg



4錠/回、2回/日(成人)

アゼブチン錠1mg



2錠/回、2回/日(成人)

ゼスラン錠3mg



2錠/回、2回/日(成人)

ニボラジン錠3mg



2錠/回、2回/日(成人)

ザジテンカプセル1mg



1カプセル/回、2回/日(成人)

アレジオン錠10



2錠/回、1回/日(成人)

アレジオン錠20



1錠/回、1回/日(成人)


④ トロンボキサンA<sub>2</sub>合成阻害薬

ドメナン錠100mg



400mg/日、2回/日(成人)

ドメナン錠200mg



400mg/日、2回/日(成人)

⑤ トロンボキサンA<sub>2</sub>拮抗薬

プロニカ錠40



2錠/回、1回/日(成人)

プロニカ錠80



1錠/回、1回/日(成人)

プロニカ顆粒10%



80mg/回、  
1回/日(成人)

⑥ TH<sub>2</sub>サイトカイン阻害薬

アイピーディカプセル50




2カプセル/回、3回/日(成人)

アイピーディカプセル100



1カプセル/回、3回/日(成人)

アイピーディドライシロップ5%



3mg/kg/回、2回/日(小児)

漢方製剤

ツムラ-19 (ツムラ小青竜湯エキス顆粒)



9g/日、2~3回/日 (成人)

ツムラ-29 (ツムラ麦門冬湯エキス顆粒)



9g/日、2~3回/日 (成人)

ツムラ-96 (ツムラ柴朴湯エキス顆粒)



7.5g/日、2~3回/日 (成人)

N19 (コタロー小青竜湯エキス細粒)



7.5g/日、2~3回/日 (成人)

N29 (コタロー麦門冬湯エキス細粒)



15g/日、2~3回/日 (成人)

N55 (コタロー麻杏甘石湯エキス細粒)



6g/日、2~3回/日 (成人)

EK-19 (クラシエ小青竜湯エキス細粒)



6g/日、3回/日 (成人)

EKT-19 (クラシエ小青竜湯エキス錠)




18錠/日、2~3回/日 (成人)

EK-96 (クラシエ柴朴湯エキス細粒)




7.5g/日、3回/日 (成人)

KB-19 (クラシエ小青竜湯エキス細粒)



6g/日、2回/日 (成人)

KB-96 (クラシエ柴朴湯エキス細粒)



7.5g/日、2回/日 (成人)

去痰薬

ムコソルバン錠 15mg



1錠/回、3回/日 (成人)

ムコダイン錠 250mg



2錠/回、3回/日 (成人)

ムコダイン錠 500mg



1錠/回、3回/日 (成人)

クリアナール錠 200mg



2錠/回、3回/日 (成人)

ムコダイン DS50%



1g/回、3回/日 (成人)  
0.02g/kg/回、  
3回/日 (小児)

ムコダイン シロップ 5%



0.6mL/kg/日  
3回/日 (幼・小児)

スペリア錠 200



2錠/回、3回/日 (成人)